

LIPOFILLING o LIPOSTRUCTURE

Iniezione di tessuto adiposo proprio

INFORMAZIONI GENERALI

Questo intervento risolve in maniera eccellente uno stato di marcata ipotrofia del tessuto sottocutaneo della faccia: labbra, zigomi, glabella. Può essere associato ad un lifting, ad un peeling o ad un impianto di acido ialuronico dando un risultato naturale. Il lipofilling e' un intervento che rispetta molto la natura del nostro corpo, non inserendo sostanze estranee ad esso dando inoltre un risultato duraturo dal momento che una quota di grasso introdotta si innesta, cioè resta nel luogo iniettato (circa il 30%).E' un intervento che non lascia nessuna cicatrice.

L'INTERVENTO

Può essere eseguito in anestesia locale, eventualmente accompagnata da una leggera sedazione. Consiste nell'aspirazione del proprio grasso dalla coscia, dal ginocchio o dall' addome; esso viene lavato e reiniettato immediatamente. Può essere eseguito in anestesia locale in ambiente ambulatoriale.

COSA ASPETTARSI DOPO L'INTERVENTO

Dopo l' intervento per circa una settimana (fino a 2 settimane) sul viso nelle aree di iniezione e sulla zona di prelievo noterà un moderato gonfiore che sarà accompagnato da ecchimosi (lividi) che comunque possono essere nascosti da un fondotinta coprente. Sarà un fenomeno passeggero che si risolverà perfettamente.

PREPARAZIONE PRE-OPERATORIA

E' consigliabile evitare contatti con persone che abbiano raffreddore o altre malattie contagiose. Bisogna evitare di prendere aspirina per 2 settimane prima e 2 settimane dopo l'intervento. L'aspirina riduce la capacità di coagulazione del sangue e può produrre complicazioni Si consiglia di eliminare il fumo per almeno due settimane prima dell'intervento. Alcuni studi hanno dimostrato che l'incidenza di complicanze e' 10 volte superiore nei pazienti fumatori che non in quelli che non fumano, inoltre risulta esservi un migliore attecchimento del tessuto adiposo innestato . Se il fumo viene eliminato per 10 giorni o piu' prima dell'operazione, l'incidenza delle complicanze e' pari a quella dei non fumatori.

Si consiglia alle pazienti in trattamento con contraccettivi orali di interrompere l'assunzione di tali farmaci un mese prima dell'intervento.

TRATTAMENTO POST-OPERATORIO

Riposo a letto e' consigliato nelle prime 24 ore dopo l'intervento. Dovrà applicare per le prime 12 ore delle borse di ghiaccio per ridurre l' inconveniente. Dovrà per i primi 3/4 giorni adoperare un latte ed un tonico per la pulizia del viso. Dopo 2/3 giorni potrà applicare un leggero make-up. Si sconsiglia di bere alcolici per una settimana dopo l'intervento.

POSSIBILI COMPLICAZIONI

Le complicazioni, in genere, sono rare.

Sanguinamento. Esso può presentarsi durante il primo giorno post-operatorio.

Infezioni. Sono rare e rispondono generalmente molto bene alla terapia antibiotica.

RIPRESA DELL'ATTIVITA' FISICA

Le **attività sportive** potranno essere dopo 1 settimana per quanto concerne lo jogging, danza, joga, mentre per gli sport più intensi (sci, tennis, calcio, pallacanestro, vela, nuoto, pesca subacquea) sarà preferibile attendere per lo meno 2 settimane.

La **guida** dell'automobile potrà essere ripresa il giorno successivo; l'esposizione al sole o a lampade UVA dopo 1 settimana.