

Chirurgia estetica genitale femminile

RIDUZIONE O CORREZIONE DI ASIMETRIE DELLE PICCOLE LABBRA (LABIOPLASTICA)

Consiste nella rimozione di tessuto eccedente delle piccole labbra che, ipertrofiche, protrudendo oltre le grandi, possono dare disagio sia da un punto di vista estetico che funzionale.

La richiesta, da un lato per una possibile fastidiosa irritazione, in seguito a pratica sportiva o uso di indumenti stretti, può nascere dall'altro dal semplice desiderio di correggere un inestetismo fonte di disagio in presenza del partner.

L'intervento si effettua in anestesia locale e dura 30-40 minuti: le piccole incisioni, vengono suturate con filo riassorbibile che non richiede la rimozione dei punti, e guariscono in breve tempo senza lasciare tracce.

Subito dopo l'intervento la paziente può lasciare l'ambulatorio con appropriata medicazione. Il giorno dopo può effettuare una doccia. In alcuni casi può riprendere l'attività professionale dopo 24 ore facendo attenzione di evitare particolari movimenti con le gambe. L'attività sessuale dopo 4-6 settimane.

I risultati sono permanenti.

Rare complicanze possono essere infezioni, sanguinamento ed anomala cicatrizzazione.

LABIOPLASTICA (delle grandi labbra)

Le grandi labbra dovrebbero coprire le piccole labbra, presentarsi volumetricamente di certe dimensioni e non essere afflosciate.

Un lipofilling può aumentarne le dimensioni; si preleva del tessuto adiposo e lo si inietta nelle grandi labbra dopo adeguato trattamento. La procedura di labioplastica si effettua in anestesia locale assistita e dura circa 30 minuti.

Rapido il ritorno alle normali occupazioni.

RICOSTRUZIONE DELL'IMENE (IMENOPLASTICA)

La ricostruzione dell'imene (o imenoplastica) è un semplice intervento, eseguibile in regime di day hospital, in cui i lembi lacerati dell'imene vengono riaccostati e suturati, creando una situazione simile a quella precedente al primo rapporto sessuale.

Il suo scopo infatti è quello di restituire la verginità anatomica.

LIPOSUZIONE DEL PUBE

La Liposuzione del Pube consiste nella rimozione del grasso in eccesso raccolto nella regione che sormonta il monte di Venere, con una miniliposuzione effettuata attraverso un taglio millimetrico di cui non rimane traccia. La liposuzione si effettua in anestesia locale e non richiede ricovero.

Questi interventi, singolarmente o in combinazione tra loro, possono essere eseguiti utilizzando il laser (LASERVAGINOPLASTICA) che effettuando incisioni chirurgiche precise, con minima fuoriuscita di sangue, riduce i tempi di esecuzione, la necessità di eventuali ricoveri e di possibili complicanze.

ESPOSIZIONE DEL CLITORIDE

Rimozione della pelle esuberante che ricopre il clitoride a volte ipertrofico.

E' un intervento che con il passare del tempo può ridurre la sensibilità della zona resa scoperta.

Si effettua in anestesia locale, non necessita di ricovero.

CLITORIDOPLASTICA DI RIDUZIONE

Se il clitoride è eccessivamente prominente, questo può essere ridotto mediante un intervento che ne preserva la sensibilità. La procedura si effettua in anestesia locale assistita o generale, dura circa 20 minuti e permette un pieno ritorno alle normali occupazioni in pochi giorni. L'attività sessuale può essere ripresa dopo 2-3 settimane.

RESTRINGIMENTO DELLA VAGINA, RIMODELLAMENTO DOPO IL PARTO (VAGINAL TIGHTENING COSMETICO)

L'intervento di restringimento della vagina mira a ridurre le dimensioni della vagina, in particolare della sensibile parte terminale, e correggere eventuali inestetismi o asimmetrie lasciate da una precedente episiotomia, ai fini di incrementare la sensibilità durante l'atto sessuale. Secondo Masters e Johnson, la gratificazione sessuale della donna è direttamente correlata alla quantità di forza frizionale generata durante la penetrazione.

Il ringiovanimento vaginale può restaurare pertanto una forza frizionale ottimale durante il rapporto sessuale, oltre a migliorare l'aspetto estetico delle strutture vaginali esterne, conferendo loro un aspetto più giovanile.

L'intervento, che non ha capacità correttive su problemi come l'incontinenza o il prolasso, viene eseguito in anestesia generale con una notte di ricovero.

Si utilizzano suture riassorbibili che scompaiono in 2-3 settimane; può residuare gonfiore per circa 7 giorni. I rapporti sessuali possono essere ripresi dopo sei settimane.

Anche tale procedura può essere eseguita utilizzando il laser (LASER VAGINAL REJUVENATION).