

## LIFTING TEMPORALE

### INFORMAZIONI GENERALI

Il lifting temporale e' un intervento di media chirurgia il cui scopo e' il miglioramento dell'aspetto della parte alta del viso. Il miglioramento viene ottenuto mediante lo stiramento della cute e dei muscoli della faccia. Il grado di miglioramento varia da soggetto a soggetto ed e' influenzato dalle condizioni fisiche della cute, dal grado di danno prodotto dalle radiazioni solari, dalle strutture ossee sottostanti e da una varieta' di altri fattori.

### L'INTERVENTO

L'intervento generalmente viene eseguito in anestesia generale o in neuroleptoanestesia. Questo ultimo tipo di anestesia e' una combinazione fra una sedazione somministrata per via endovenosa ed anestesia locale. Attraverso l'infusione endovenosa vengono somministrati dei farmaci che inducono uno stato mentale di rilassamento e di calma. L'anestetico locale e' iniettato nei tessuti della faccia quando il paziente sta gia' dormendo, in modo che il fastidio dell'iniezione non venga assolutamente avvertito. Non vi e' assolutamente dolore durante l'intervento chirurgico. A volte e' preferibile un'anestesia generale completa e questo puo' essere discusso con l'anestesista. In ogni caso l'anestesia viene somministrata dall'anestesista che e' sempre presente durante tutto l'intervento. Sono anche pronte per l'uso, tutte le attrezzature necessarie per la completa sicurezza dell'operazione.

L'intervento verra' eseguito in una struttura autorizzata alla realizzazione di un intervento chirurgico, ed il paziente potra' tornare a casa lo stesso giorno.

La durata e' di circa 2 ore. Una piccola striscia di capelli viene asportata in regione temporale, e, se bisogna provvedere ad un lifting della fronte, anche in regione frontale o piu' indietro, al vertice. I margini della ferita del cuoio capelluto, ricoperti da capelli di normale lunghezza, verranno accostati mediante punti di sutura e le incisioni verranno quindi nascoste.

La cute in eccesso viene asportata e la chiusura viene eseguita con fili di sutura molto sottili. Alla fine dell'intervento, viene applicato un abbondante e morbido bendaggio compressivo a modo di turbante in modo da mantenere una moderata compressione su tutta l'area dell'intervento. Cio' viene eseguito al fine di ottenere una riduzione dell'edema (gonfiore) e proteggere le ferite.

Il face lift e' a volte eseguito in combinazione con la blefaroplastica o altri tipi di intervento al volto. Di queste si puo' discutere con i pazienti qualora desiderino maggiori informazioni.

### COSA ASPETTARSI DOPO L'INTERVENTO

Dopo l'intervento e' presente un certo grado di edema (gonfiore), eritema (arrossamento) e di ecchimosi (lividi), ma generalmente il fastidio ed il dolore sono minimi o assenti. Successivamente all'iniziale entusiasmo per l'operazione, prima che i pazienti possano vedere il risultato ottenuto, puo' subentrare un lieve grado di depressione che non e' insolito ma non e' causa assolutamente di allarme. Essa in genere si risolve rapidamente.

Puo' intervenire una perdita di capelli di modesto grado intorno alle cicatrici. In casi eccezionali questo puo' essere permanente. La formazione di cicatrici cheloidi e' veramente rara intorno al volto ma occasionalmente queste possono presentarsi al di dietro dell'orecchio. Queste sono di minimo grado e possono essere trattate appropriatamente con eccellenti risultati.

## PREPARAZIONE PRE-OPERATORIA

E' consigliabile evitare contatti con persone che abbiano raffreddore o altre malattie contagiose.

Bisogna evitare di prendere aspirina per 2 settimane prima e 2 settimane dopo l'intervento. L'aspirina riduce la capacita' di coagulazione del sangue e puo' produrre complicazioni.

Si consiglia di eliminare il fumo per almeno due settimane prima dell'intervento.

Alcuni studi hanno dimostrato che l'incidenza di complicanze e' 10 volte superiore nei pazienti fumatori che non in quelli che non fumano. Se il fumo viene eliminato per 10 giorni o piu' prima dell'operazione, l'incidenza delle complicanze e' pari a quella dei non fumatori.

Nel periodo immediatamente post-operatorio e nei primi giorni successivi e' consigliata una dieta liquida e con alimenti morbidi.

Si consiglia alle pazienti in trattamento con contraccettivi orali di interrompere l'assunzione di tali farmaci un mese prima dell'intervento.

E' indispensabile praticare uno shampoo antisettico la sera prima e la mattina dell'intervento. Eventuali tinture di capelli sono consentite fino a tre giorni prima dell'operazione

## TRATTAMENTO POST-OPERATORIO

Il giorno dopo l'intervento la medicazione viene cambiata, le ferite controllate e viene applicata una nuova medicazione piu' leggera e piu' piccola di quella precedente.

Il quarto o quinto giorno post-operatorio queste medicazioni vengono rimosse.

Qualora sia stata eseguita anche la blefaroplastica, anche le suture di questo intervento verranno rimosse. Da questo momento in poi, i pazienti potranno delicatamente lavare i capelli e non sara' necessario piu' alcun bendaggio.

Una settimana dopo l'intervento vengono rimossi alcuni punti sul cuoio capelluto. 10-14 giorni dopo l'intervento, i restanti punti di sutura verranno rimossi. I pazienti generalmente e in dipendenza dal grado dell'intervento, saranno normalmente presentabili nel giro di due o tre settimane.

## POSSIBILI COMPLICAZIONI

In qualsiasi intervento chirurgico vi e' un certo grado di rischio. Certamente la somministrazione di farmaci di qualsiasi genere puo' produrre risultati gravi ed imprevedibili. Vengono prese, comunque tutte le precauzioni per prevenire tali situazioni e trattarle opportunamente in modo da evitare prontamente qualsiasi conseguenza, qualora dovesse verificarsi.

I rischi specifici del lifting sono limitati e generalmente rari.

**Ematomi.** La piu' comune complicazione, che comunque e' estremamente rara, e' la raccolta di sangue o di coaguli al di sotto della cute. Tali raccolte vengono chiamate ematomi. Se l'ematoma e' di dimensioni tali per cui sia necessaria la rimozione, questa si puo' ottenere mediante aspirazione o attraverso l'apertura di un piccolo tratto delle ferita chirurgica. Ciò non produrra' comunque effetti negativi sul risultato finale.

**edema (gonfiore).** L'edema si risolve nel giro di 2-3 settimane ma un gonfiore di modesto grado puo' persistere per alcuni mesi. In genere cio' e' notato soltanto dal paziente.

**Ecchimosi (lividi).** Le ecchimosi in genere sono localizzate nell'area immediatamente sottostante agli occhi. Scompaiono nel giro di una settimana ma occasionalmente possono persistere un po' piu' a lungo e possono agevolmente essere

mascherate con il trucco.

#### RIPRESA DELL'ATTIVITA' FISICA

E' prevista per la prima settimana dopo l'intervento riposo assoluto. Nelle prime 24-48 ore e' consigliato riposo a letto. Dopo e' possibile alzarsi, ma si consiglia di non uscire di casa per i primi 3-4 giorni. Durante la seconda-terza settimana saranno riprese gradualmente le normali attivita' fisiche. In questo periodo non e' consigliabile praticare sport o esercizio fisico, ma se i pazienti si sentono in grado di farlo possono uscire per passeggiate e per attivita' sociali non faticose. Dopo la terza settimana qualsiasi altra attivita' e' consentita.

E' possibile lavare i capelli delicatamente dopo la rimozione delle medicazioni. Altri trattamenti o tinture non possono essere eseguite prima di tre settimane dopo l'intervento. La guida dell'automobile e' consentita dopo una settimana come anche l'attivita' sessuale (entro limiti ragionevoli).

Il sole e' estremamente dannoso per la faccia, particolarmente in seguito ad interventi di chirurgia estetica sul viso. Evitare quindi accuratamente il sole, limitando l'esposizione al minimo ed usando creme protettive in abbondanza. Il cappello e gli occhiali da sole potranno rivelarsi molto utili. Al di la dei danni diretti sulla cute della faccia, il sole provoca sulle cicatrici recenti un arrossamento e stimola la formazione di cicatrici spesse: potrebbe inoltre stimolare in alcune aree una colorazione piu' intensa che poi non scompare del tutto quando l'abbronzatura va via.

E' quasi sempre presente un certo grado di riduzione della sensibilita' al davanti dell'orecchio ed al collo. Quantunque la sensibilita' normale tenda a riprendere gradatamente, un lieve grado di ipoestesia (riduzione della sensibilita') puo' persistere per alcuni mesi. Agli uomini si consiglia di essere estremamente prudenti nella rasatura durante il periodo post-operatorio. Potrebbe essere preferibile l'uso di rasoi elettrici. Anche l'uso del calore deve essere limitato (compresse calde sul viso, phon elettrico) in quanto per la riduzione della sensibilita' la cute potrebbe essere ustionata senza che il paziente se ne accorga.