



Rivitalizzazione dermica Iniezione di molecole biologicamente attive

Con tale termine vengono indicate tutte le terapie che stimolano le cellule presenti nella cute e sottocute. Sono farmaci iniettati direttamente con aghi o addirittura piccole cannule.

Fra le terapie più semplici si possono descrivere l'iniezione nel derma di vitamine varie, o del dmae (quest'ultimo avrebbe un effetto tensore sul derma), o ad esempio dell'acido ialuronico non cross-linkato (quindi senza effetto filler). Tali terapie non hanno una letteratura che sostenga il loro utilizzo. Sono comunque, a detta dei pazienti migliorative, senza particolari effetti collaterali (ecchimosi, lieve dolore momentaneo, edema) e quindi sono entrate nell'uso comune.

Diverso è l'utilizzo della pappa piastrinica o della lipostructure che sono procedure più impegnative anche sotto il punto di vista economica e che comunque sono testate sotto il profilo clinico garantendo una maggiore e studiata efficacia.

La pappa piastrinica viene ottenuta dal sangue del paziente e quindi viene iniettata con tecnica a micropomfi nel derma del paziente.

La lipostructure (vedi lipofilling) è invece una piccola liposuzione con prelievo di grasso che viene centrifugato ed iniettato in faccia sia per un effetto volumizzante che per un effetto stimolante grazie a cellule precursori delle cellule staminali presenti nel grasso.

Effetti secondari o collaterali

Le iniezioni possono produrre effetti collaterali di natura transitoria, quali gonfiore, arrossamenti e sensibilizzazione. Sono stati riportati casi isolati di sviluppo di piccoli bozzi a livello dell'area trattata, nonché altre irregolarità la cui durata può essere di vari mesi, se l'iniezione intracutanea è più superficiale.

Sono stati inoltre riportati rari casi di reazioni infiammatorie, consistenti in arrossamento, gonfiore ed indurimento tissutale a livello della sede di iniezione, a volte con coinvolgimento dei tessuti circostanti.

Consigli post trattamento

Non toccare o truccare l'area trattata per le prime ore successive al trattamento



Rivitalizzazione dermica

Iniezione di molecole biologicamente attive

Non esporre l'area trattata a calore o freddo intensi finchè il gonfiore o il rossore scompaiono

Un leggero arrossamento, gonfiore, dolorabilità e sensazione di prurito nell'area trattata sono da ritenersi una normale conseguenza dell'iniezione: sono temporanee e di solito scompaiono entro qualche ora.

Le iniezioni possono contribuire a causare un'eruzione di herpes simplex facciale

Le metodica più invasiva (la lipostructure), richiede sia anestesia locale che una invalidità post-operatoria importante dovuta ad ecchimosi ed edema.