

## **Attenzioni da seguire nel post trattamento con fillers**

Non toccare o truccare l'area trattata per le prime ore successive al trattamento.

Non esporre l'area trattata a calore o freddo intensi finchè il gonfiore e il rossore scompaiono.

Un leggero arrossamento, gonfiore o dolorabilità e sensazione di prurito nell'area trattata sono da ritenersi una normale conseguenza dell'iniezione: sono temporanee e di solito scompaiono entro pochi giorni; nelle labbra si risolvono in una settimana, mentre con trattamento con infiltrativi "volumetrici" possono arrivare fino a due settimane. Se i disturbi non si riducono o si verificano altre reazioni, rivolgersi al proprio medico.

Le iniezioni possono contribuire a causare una eruzione di herpes simplex facciale.

L'assunzione di aspirina (acido acetil-salicilico) o farmaci analoghi, può determinare un aumento del sanguinamento nel punto di iniezione e di eventuali ecchimosi.

I prodotti che contengono lidocaina riducono la sensazione di dolore e la temperatura nell'area trattata per circa una o due ore dopo l'iniezione. Porre attenzione al contatto con bevande o cibo caldo.

Di norma è consigliato un trattamento di follow-up 6-12 mesi dopo il primo trattamento entro 6 mesi per le labbra). In caso di trattamento con Restylane vital è raccomandato il follow-up dopo 4-6 mesi.