

## Consigli post trattamento per macrolane

È normale riscontrare sintomi quali gonfiore, arrossamento, sensibilità, dolore, lividi o prurito nella sede di iniezione nei primi giorni successivi al trattamento con macrolane. Si raccomanda di contattare il proprio medico se tali sintomi peggiorassero dopo 2-3 giorni o si manifestino altri tipi di reazioni, quali febbre o malessere.

Nelle prime 2-3 settimane successive al trattamento, non fare esercizi fisici pesanti o attività che possano porre eccessiva pressione sull'area trattata. Inoltre non massaggiare l'area trattata. Nei casi di trattamento al seno, si raccomanda l'uso di un reggiseno di supporto nelle prime settimane successive all'infiltrazione.

### Per il trattamento al seno

L'auto-esame del seno è una pratica importante, da effettuare regolarmente. Durante l'auto-esame del seno, si prega di considerare che la consistenza del macrolane può apparire diversa da quella dei tessuti del vostro corpo.

In caso di esecuzione di mammografia si raccomanda di informare il personale medico radiologico della presenza dell'impianto di macrolane, prima di eseguire l'esame. Per quanto concerne gli esami radiologici in genere si consiglia di leggere ulteriori informazioni sul sito [www.macrolane.com](http://www.macrolane.com).

Macrolane è un programma di rimodellamento corporeo non permanente che prevede trattamenti di mantenimento del risultato estetico. Si raccomanda di condividere con il proprio medico gli obiettivi prefissati ed i trattamenti più adeguati.